

## Exposition du 15/10/2018

Noms valides	Autorités	Synonyme	Habitats
<b>Agaricus campestris</b>	L.:Fr.	Psalliota Campestris (L.:Fr.) Quelet	Dans les prés pâturés, les jardins, les litières de chênes verts et en ZA.
<b>Amanita citrina</b>	(Jac.Schäffer) Pers.	Amanita Mappa (Batsch) Bertillon	Sous feuillus et conifères, sur sol siliceux.
<b>Amanita vittadinii</b>	(Moretti) Vittadini	Lepidella Vittadinii (Moretti) Gilbert	Sous les feuillus, surtout dans le sud.
<b>Bovista plumbea</b>	Pers.:Pers.	Lycoperdon Ardesiacum Bulliard	Dans l'herbe des prés et des bois, jusqu'en zone alpine.
<b>Hydnum repandum</b>	L.:Fr.	Sarcodon Repandus (L.:Fr.) Quelet, non ss Bolton	Dans les bois de feuillus (surtout) et de conifères.
<b>Hygrophorus cossus</b>	(Sowerby) Fr.	Limacium Cossus (Sowerby) Fr.	Surtout sous feuillus sur sol argileux.
<b>Hygrophorus hypothejus</b>	(Fr.:Fr.) Fr.	Hygrophorus Vitellum (Albertini et Schweinitz) Saccardo	Surtout sous pins sur sol siliceux.
<b>Hygrophorus nemoreus</b>	(Pers.:Fr.) Fr.	Hygrophorus Opiparus Fr.	Sous les feuillus, surtout sur sol calcaire.
<b>Hypholoma fasciculare</b>	(Hudson:Fr.) Kummer	Naematoloma Fasciculare (Hudson:Fr.) Karsten	En touffe (surtout sur souches) sur feuillus et conifères.
<b>Hypholoma lateritium</b>	(Jac.Schäffer:Fr.) Kummer	Geophila Sublateritia (Fr.) Quelet	En touffe surtout sur souches de feuillus.
<b>Marasmius oreades</b>	(Bolton:Fr.) Fr.	Marasmius Caryophyllaeus (Jac.Schäffer) Schröter	Dans l'herbe des pelouses ou des prés (rare sous épicéas).
<b>Pluteus salicinus</b>	(Pers.:Fr.) Kummer	Pluteus Petasatus (Fr.) Gillet, ss Ricken, non ss Kühner et Romagnesi	Sur troncs et souches de feuillus (surtout saules et aulnes).
<b>Russula emetica</b>	(Jac.Schäffer:Fr.) Pers.	Collybia fusipes (Bull.) Quéf. Russula Ochracea (Pers.) Fr., ss	Dans les bois marécageux et les hauts marais avec pins ou épicéas.
<b>Russula fellea</b>	(Fr.:Fr.) Fr.	Bataille, Gillet	Sous les feuillus (surtout hêtres) et sous les conifères, sur tout sol.
<b>Russula integra</b>	(L.) Fr.	Russula Polychroma Singer Ex Hora, ss Auct. Brit.	Sous conifères en montagne sur tout sol (surtout calcaire).
<b>Trametes versicolor</b>	(L.:Fr.) Lloyd	Coriolus Hirsutululus (Schweinitz) Murrill	Sur bois mort ou vivant, surtout de feuillus.

<b>Tremella mesenterica</b>	Retzius:Fr.	Tremella Lutescens (Pers.:Fr.) Pers. Tricholoma Sulphureum Var. Bufonium	Sur branches mortes tombées et souches de feuillus.
<b>Tricholoma bufonium</b>	(Pers.:Fr.) Gillet	(Pers.:Fr.) Quelet	Sous feuillus et conifères sur sol acide.
<b>Tricholoma columbetta</b>	(Fr.:Fr.) Kummer	Agaricus DiffRACTUS Chevallier	Sous feuillus (surtout chênes) sur sol acide (rare sous conifères).
<b>Tricholoma focale</b>	(Fr.) Ricken	Armillaria Focalis (Fr.) Karsten	Dans les pinèdes arénacées.
<b>Tricholoma saponaceum</b>	(Fr.:Fr.) Kummer	Agaricus Ereuthonitrum Secretan	Dans les bois de feuillus (chênes surtout) et de conifères.
<b>Tricholomopsis rutilans</b>	(Jac.Schäffer:Fr.) Singer	Agaricus Xerampelinus Sowerby	Sur souches et racines de conifères.
<b>Total</b>			22